

睾丸实质回声正常,且睾丸血流丰富,与精索连接处可见“漩涡状”血流信号,术后证实为早期不完全扭转。6 例患儿超声提示实质不均匀团状低回声,睾丸内无血流信号,后证实为完全扭转。

临床治疗睾丸扭转的最佳方法是采取手术治疗,包括手法复位和手术复位两种类型,但是手法复位存在复发的可能。手术复位时如发现患者睾丸血液循环极差且复位后不能恢复正常,则应考虑对睾丸进行切除。在睾丸扭转的早期,对患者使用手法复位能取得不错的治疗效果,但如果发病时间较长则只能采用手术治疗。

综上所述,临幊上睾丸下降不全的患儿常见,但是同时合并睾丸扭转者则不多,超声对这类患儿有较好的诊断价值,值得推广应用。

参考文献

- Hershkovitz E, Arafat M, Loewenthal N, et al. Combined adrenal failure and testicular adrenal rest tumor in a patient with nicotinamide nucleotide transhydrogenase deficiency [J]. Pediatr Endocrinol Metab, 2015, 28(9-10): 1187-1190.
- 周立军,高莉娟,刘殿勇,等.新生儿睾丸扭转 3 例临床分析[J].中国实验诊断学,2013,17(11):2102-2103.
- 张拾命,黄道中.超声造影诊断睾丸扭转 2 例[J].中国医学影像学杂志,2011,19(11):822-823.

(收稿日期:2016-06-20)

· 病例报道 ·

Ultrasonic diagnosis of bilateral inguinal ovarian hernia in infant: a case report


超声诊断婴儿双侧腹股沟卵巢疝 1 例

唐琪

[中图法分类号] R445.1

[文献标识码] B

患儿女,42 d,因反复哭闹,双侧腹股沟触及包块就诊。体格检查:皮肤外观正常,双侧腹股沟至大阴唇区触及明显外凸包块,质地较硬,无肠管样柔软感。超声表现:左、右侧腹股沟至大阴唇区分别探及大小约 2.0 cm×1.0 cm、2.5 cm×1.4 cm 低回声肿块,边界清晰,内见多枚小圆形无回声区(图 1)。双侧肿块均与腹腔相通,内部均探及稍丰富血流信号。超声提示:双侧腹股沟卵巢疝(疝入大阴唇)。后经随访手术证实为卵巢嵌顿疝。



A:左侧;B:右侧。

图 1 腹股沟卵巢疝超声图像

讨论:腹股沟卵巢疝为卵巢通过腹股沟内环口进入腹股沟形成,常发生于单侧,双侧少见。超声能够快速、准确地诊断该病,其特征性表现为腹股沟探及卵巢回声,长径<1 cm,内见一个或多个小卵泡^[1]。由于女婴腹股沟管细短,且垂直走行,因此卵巢疝易发生嵌顿。当卵巢疝入大阴唇发生嵌顿时,超声检查可见卵巢体积明显增大,若卵巢内部血流信号增多,此时可提示临幊及时手术,避免卵巢发生坏死;若卵巢血流信号明显减少或未

探及时,则预后较差,卵巢坏死可能性大^[2]。本例患婴超声表现符合典型腹股沟卵巢嵌顿疝,且预后良好。

腹股沟卵巢疝主要与 Nuck 管囊肿、腹股沟肠疝、腹股沟网膜疝、腹股沟脂肪瘤及大阴唇肥大等鉴别诊断。Nuck 管囊肿超声显示腹股沟区探及液性包块,当卵巢疝为卵巢囊肿引起的疝时,两者不易鉴别^[3]。腹股沟肠疝表现为质地柔软的包块,大小可随体位改变,超声显示包块由肠管组成,压迫后可变形,亦可见肠蠕动波。腹股沟网膜疝表现为质地极柔软的小包块,忽隐忽现,常在腹内压增高时才有可能被检出,超声显示包块由网膜组成,压迫后可被完全压瘪,完全回纳至腹腔。腹股沟脂肪瘤表现为质地中等、边界清晰的包块,超声显示肿块多由高回声脂肪团构成。大阴唇肥大表现为大阴唇脂肪层增厚,质地均匀,包块感不明显,超声显示大阴唇皮下脂肪均匀性增厚。

参考文献

- 夏培,吴瑛.小儿超声诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2001:387-392.
- 王荣,王兴田,崔建华.超声诊断女婴腹股沟卵巢嵌顿疝的价值[J].临床超声医学杂志,2009,11(3):193-194.
- 林芸,李建卫,唐力.高频超声在女婴腹股沟疝伴卵巢嵌顿诊断中的应用[J].福建医药杂志,2013,35(5):121-123.

(收稿日期:2016-07-31)